

# 手術計画表及びお薬について

	診察・定期検査	目薬	飲み薬	入浴
手術の 3日前から 手術前日	△ 必要に応じて	○		全身 ○
火 手術当日	○	○	○	×
水 手術後 1日目	○	×	○	首から下のみ ○
木 手術後 2日目	○	○	○	首から下のみ ○ 保護めがね使用
金 手術後 3日目	○	○	○	首から下のみ ○
土 手術後 4日目	○	○	○	首から下のみ ○
日 手術後 5日目	×	○	○	首から下のみ ○
月 手術後 6日目	○	○	○	シャワーによる 洗髪・洗顔可 ○
火～土 手術後 7～11日目	△ 必要に応じて	○	○	シャワーによる 洗髪・洗顔可 ○
手術後 12日目	※手術日翌週から 隔日等、受診間隔 を空けていきます。	○	○	全身 保護めがね不要 ○



## ベガモックス

目薬 手術前3日～手術当日  
手術後2日～3ヶ月間

手術後、ばい菌に感染しないようにします。



## リンデロン

目薬 手術後2日～1ヶ月間  
手術後の炎症を抑えます。



## ジクロフェナック

目薬 手術後2日～3ヶ月間  
手術後の炎症を抑えます。



## ダイアモックス

飲み薬 手術当日

眼圧(目の硬さ)を下げます。



## フロモックス

飲み薬 手術当日～計6日間

手術後、ばい菌に感染しないようにします。  
(抗生物質)



## レベニン

飲み薬 手術当日～計6日間

抗生物質の副作用で  
お腹がゆるくなることを防ぎます。

※車の運転、仕事、スポーツ、パーマ、染毛、化粧は、必ず医師の指示に従ってください。